

Prélèvements obligatoires inscrits dans l'annexe sanitaire du Stud Book Français 2011
Prélèvements MCE, AVE à faire effectuer après le 1er janvier et avant toute saillie dans un laboratoire agréé

	POUR LA JUMENT		POUR L'ÉTALON
	MAIDEN	VIDE	
RECHERCHE METRITE CONTAGIEUSE ÉQUINE	Site : clitoris (sinus et/ou fosses)		Les tests métrite et artérite peuvent être réalisés à partir du 1er décembre N-1 Site : fosse urétrale
	1 résultat négatif : ok	1 résultat négatif : ok	1 résultat négatif : ok
RECHERCHE ARTERITE VIRALE ÉQUINE	1 résultat sérologique négatif : ok 2 résultats sérologiques positifs stables ou déclinants à 14 jours d'intervalle : ok 1 résultat sérologique positif stable ou déclinant par rapport à 1 résultat stable ou déclinant de N-1 ou N-2, un laboratoire différent est toléré : ok		1 résultat sérologique négatif : ok 1 résultat sérologique positif avec certification de vaccination conforme : ok 1 résultat sérologique positif sans certification de vaccination conforme, à effectuer : - virologie dans un seul sperme avec résultat négatif : ok - virologie positive, étalon excréteur => protocole spécifique
RECHERCHE ANEMIE INFECTIEUSE DES ÉQUIDÉS	Test de Coggins : 1 résultat négatif pour une 1ère approbation à la monte publique datant de moins de 3 mois, puis datant de moins de 3 ans		

Vaccinations obligatoires inscrites dans l'annexe sanitaire du Stud Book Français 2011

	Avant la saillie		Avant la demande de carnet de monte	
GRIPPE	Vaccination préalable à la DPS et < 1 an : ok Soit une primo vaccination : 2 injections séparées de 3 à 6 semaines puis un rappel au moins annuel : ok Soit sur les 3 dernières années au moins un rappel annuel : ok		Vaccination préalable à la demande de carnet et < 1 an : ok Soit une primo vaccination : 2 injections séparées de 3 à 6 semaines puis un rappel au moins annuel : ok Soit sur les 3 dernières années au moins un rappel annuel : ok	
RHINOPNEUMONIE	Vaccination préalable à la DPS et < 1 an : ok Soit une primo vaccination : 2 injections séparées de 3 à 6 semaines, puis rappel au moins annuel, mieux tous les six mois : ok Soit sur les 3 dernières années au moins un rappel annuel : ok		Vaccination préalable à la demande de carnet et < 1 an : ok Soit une primo vaccination : 2 injections séparées de 3 à 6 semaines, puis rappel au moins annuel, mieux tous les six mois : ok Soit sur les 3 dernières années au moins un rappel annuel : ok	

Toute rupture dans un protocole de vaccinations nécessite une primo-vaccination

Vaccination fortement recommandée inscrite dans l'annexe sanitaire du Stud Book Français 2011

Vaccination Etalon (Boute-en-train) Uniquement

	ARTERVAC®	
ARTERITE VIRALE ÉQUINE	Sérologie négative puis primo-vaccination 2 injections espacées de 3 à 6 semaines sur un étalon maintenu en isolement Rappel tous les 6 mois (tolérance de 2 mois) Lors d'une rupture du protocole de vaccination : Sérologie négative puis primo-vaccination 2 injections espacées de 3 à 6 semaines Rappel tous les 6 mois (tolérance de 2 mois) Sérologie positive : virologie dans un seul sperme avec résultat négatif et reprise vaccination Dernier vaccin > 1 an : primo vaccination - si < 1 an, rappels tous les 6 mois (+ 2 mois)	